

SPHAEROPSIDEAE.

FAM. II. — NECTRIOIDEAE Sacc. Syll., III, p. 615.

Rhynchomyces Sacc. et March.(Etym. *Rhynchos*, rostrum et *Myces*, fungus.)

Perithecia subglobosa, in rostrum subulatum abeuntia, molliuscula, laete colorata (ochraceo-rubentia). Sporulae fusoideo-bacillares, acutae, 1-septatae, hyalinae, deorsum in setulam (basidium?) cuspidatam sensim attenuata. — Est *Sphaeronaemella scolecospora*; *Eleutheromyctem longisporum* Ph. et Plow. in mentem revocat, sed ascii vere nulli.

Rhynchomyces Marchalii Sacc. in litt.

Perithecia gregaria v. subaggregata, superficialia, ovoido-subglobosa, extus hyalino-papillosa, flavidantia, contextu laxe celluloso, $145-160 = 140-125 \mu$, ostiolo subulato-rostrato $255-265 = 55-45 \mu$, stricto, glabro, ochraceo, contextu e cellulis vermicularibus subparallelis conflato; sporulae ad apicem rostri demum expulsae, et globulum albidum ellipsoideum formantes, fusoideo-bacillares, rectae v. leniter curvae, apice acutae, deorsum sensim stipitato-setigerae, $65-70 = 5,4-5,6 \mu$, 1-septatae non constrictae, hyalinae, saepius strato mucoso diaphano involutae.

Hab. in fimo vulpino. — Arduenna. Hieme 1885.

Obs. — Septulum adest obsoletum in limite inferiore conidii versus stipitem seu setulam.

HYPHOMYCETEAE.

SECT. I.—**Mucedineae** § MICRONEMAE Sacc. Mich., II, p. 45.**Oospora grandiuscula** Sacc. et March. (Pl. I, f. 5-4).

Caespituli albi, effusi, tenues, mucedinei. Hyphae steriles repentes, flaccidae, $4-6 \mu$, paree septatae, ramosae,